

syphiis diagnose

20. Dezember 2012 - 17:58 — nic

hallo,sie sagten zu mir ich müsste in labor nachfragen welchen test gemacht worden ist syphilis test ,leider hat mein hausarzt nicht mehr die befunde die ich nachgefragt habe der test war ja schön länger her dezember 2002 ,ich hatte damals kondompanne ,und habe beim hausarzt hiv test gemacht da waren schon ca.7 oder 8 nach risico paar tage kamen die befunde mus noch dazu sagen ich hatte bis dahin nicht viel ahnung von krankheiten die sich sessuel übertragen hatte aber immer kondome benutzt hatte auch was hiv angeht bei eine op hiv test machen müssen wo ich kein bescheidt bekommen habe,man kriegt ja nur bescheid wenn der positiv ist .ok jetzt noch mal zu denn befunde da wahren einige krankheiten aufgäzählt wie hepatitis b und c hiv ,ok wieder zu syphilis es gibt direkte und inderekte verfahren direkte ist ja senkret untersucht von geschwüren dann gibts doch pcr der wird doch nur in spezialfälle einzenfälle verwendet ,dann bleiben nur noch die antikörper test 7 oder 8 wochen der zu der schon ab denn zeit punkt ziemlich sicher ist ,mir ist auch nichts besonderes an mir aufgeffalle geschwüre an penis das fällt schon auf denke ich auch kein ausschlag tipische ausschlag ist doch runde rote flecken hände sie sagten es kann sogar zehn wochen dauern bis bei syphilis antikörper naweisbar sind ,ich habe auch hier öfter gelesen das 6 wochen die maximale testsicherheit habe,ps. muss der arzt eigentlich die befunde nicht behalten auch wenn alle test da drauf negativ sind?!g

[Sexuell übertragbare Krankheiten](#) [1]

©2014 Aidshilfe Salzburg, Implementation & Design [Teufl.Net IT Services](#)

Quelladresse: <http://www.aidshilfe-salzburg.at/forum/syphiis-diagnose>

Links:

[1] <http://www.aidshilfe-salzburg.at/forum/ordner-bearbeiten-6>